

RECOMENDAÇÕES PARA A SEDAÇÃO SEGURA NOS PACIENTES COM COVID19 E QUE NECESSITAM DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL:

1º FAZER USO CORRETO DO EPI;

2º FAZER USO DE PRÉ-OXIGENAÇÃO COM AMBU CONECTADO A OXIGÊNIO 10L/MIN E BOLSA DE RESERVATÓRIO POR 5 MINUTOS, PORÉM “NÃO AMBUZAR”.

MEDICAMENTOS PARA SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INTUBAÇÃO:

1. LIDOCAÍNA 1,5MG/KG EV EM BOLUS.

EX: PACIENTE DE 50KG= 75MG, PACIENTE DE 60 KG= 90MG, PACIENTE DE 70 KG= 105MG, PACIENTE DE 80 KG OU MAIS= 120MG.

2. CETAMINA 2,0MG/KG EM BOLUS.

PACIENTE DE 50KG: 100MG, PACIENTE DE 60 KG= 120MG, PACIENTE DE 70 KG= 140MG, PACIENTE DE 80 KG OU MAIS= 160MG.

TAMBÉM, ASSOCIAR 5MG (1ML) DE MIDAZOLAM.

3. SUCCINILCOLINA 1MG/KG EM BOLUS.

PACIENTE DE 50KG: 50MG, PACIENTE DE 60 KG= 60MG, PACIENTE DE 70 KG= 70MG, PACIENTE DE 80 KG OU MAIS= 80MG.

OBSERVAÇÕES

NA AUSÊNCIA DE CETAMINA, FAZER USO DE:

4. ETOMIDATO 0,2MG/KG EM BOLUS SE INSTABILIDADE HEMODINÂMICA.

PACIENTE DE 50KG = 10MG, PACIENTE DE 60 KG= 12MG, PACIENTE DE 70 KG= 14MG, PACIENTE DE 80 KG OU MAIS= 16MG.

OU MIDAZOLAM 0,5MG/KG EM BOLUS SE NÃO TIVER INSTABILIDADE HEMODINÂMICA.

PACIENTE DE 50KG= 25MG, PACIENTE DE 60 KG= 30MG, PACIENTE DE 70 KG= 35MG, PACIENTE DE 80 KG OU MAIS= 40MG.

+

FENTANIL 2MCG/KG EM BOLUS.

PACIENTE DE 50KG=100MG, PACIENTE DE 60 KG= 120MG, PACIENTE DE 70 KG= 140MG, PACIENTE DE 80 KG OU MAIS= 160MG.

Medicamentos	dose	50Kg	60Kg	70Kg	80Kg ou +
Lidocaína	1,5mg/kg	75mg	90mg	105mg	120mg
Cetamina¹	2mg/kg	100mg	120mg	140mg	160mg
Succinilcolina²	1mg/kg	50mg	60mg	70mg	80mg
Etomidato	0,2mg/kg	10mg	12mg	14mg	16mg
Midazolam	0,5mg/kg	25mg	30mg	35mg	40mg
Fentanil	2mcg/kg	100mcg	120mcg	140mcg	160mcg

1) Associar midazolam 5mg EV em bolus.

**2) Atenção! O frasco de succinilcolina tem apresentação de 500mg.
Verificar antes, pois a dose é de 1mg/kg.**